

डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट का भक्षण एक परिचर्चा : और उभरते सवाल

धीरज नरळे

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा- 403004

धूर्णीकशाभ (dinoflagellate) यह पादप्लवकों का एक उल्लेखनीय और जटिल समूह है, जो अपने विविधतापूर्ण पोषण के लिए जाना जाता है। ज्यादातर धूर्णीकशाभ अलैंगिक विंखंडनीय प्रजनन करते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ लैंगिक प्रजनन के लिए भी जानी जाती हैं। वे ऐसे युग्मकों की (gametes) उपज करते हैं, जो संयोजन के बाद चलयुग्मनज (planozygote) में परिवर्तित हो जाते हैं। चलयुग्मनज पानी में 3 से 20 दिनों तक व्यवहार्य रह सकते हैं। कुछ समय के बाद चलयुग्मनज का रूपांतरण अचल सुष्टयुग्मनज सिस्ट (hypnozygote cyst) में हो जाता है। यह सिस्ट प्लवकीय गतिशील पैशीय डायनोफ्लैजेलेट से विभिन्न होते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ (transverse) और अनुदैर्घ्य (longitudinal) कशाभिकांये (flagella) नहीं होती। इस प्रक्रिया को पूटिभवन (encystment) कहा जाता है। इस पूटिभवन प्रक्रिया में तैयार होने वाले सिस्ट का घनत्व मुक्त तैराकी (free swimming) और प्लवमान (floating) वनस्पतिक पादप्लवकों से ज्यादा होता है। उन्हें तटिय तलछट में (costal sediment) सिंक होने के लिए 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है।

सामान्यतः ज्ञात 2000 जीवित डायनोफ्लैजेलेट प्रजातियों में से 10% प्रजातियाँ उनके जीवनकाल में प्रसुप्त सिस्ट तैयार करती हैं। अपने इन्हीं गुण वैशिष्ट्य की वजह से डाइनोफ्लैजेलेट सिस्ट विभिन्न तरह की भूमिकायें अदा करती हैं। वे डायनोफ्लैजेलेट प्रजातियों के परिषेपन (dispersal) के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिस्ट का गठन डायनोफ्लैजेलेट प्रस्फुटन (bloom) का समापन माना जाता है। इसके अलावा समुद्र तलछट (sediment) में मौजूद डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट वनस्पतिक डायनोफ्लैजेलेट के लिए उगमस्त्रोत का काम करता है। जीवाश्म रिकॉर्ड में पाये जाने वाले डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट जैवस्त्रीकरण के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। समुद्र तलछट की सतह पर संचित होने वाले विषाक्त (toxic) प्रजातियों के सिस्ट विश स्त्रोत का काम करते हैं।

यह माना जाता है कि सिस्ट की प्रतिरोधी पेशीभितिका एक संरक्षण कवच का काम करती है, जो तलछट में इस जीव को पर्यावरणीय प्रभाव से बचाती है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने सिस्ट के द्विकपाठी (bivalve) और प्राणीप्लवक (zooplankton) के द्वारा होने वाले परम्भक्षण पर चर्चा की है। प्राणीप्लवकों में अस्त्रिपाद (copepod), पक्षमारीप्राणी (ciliate), रॉटिफेर (rotifer), बहुशुक (polychaete), निमाटोड (nematode), द्विकपाठी (bivalve) यह प्रजातियाँ सिस्ट के प्रकल्पित परम्भक्षक के रूप में जाने जाते हैं। सिस्ट में पाये जाने वाले तेल और

स्टार्च के कारण इन परिभक्षकों के लिये वह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है।

सिस्ट अपने जीवनकाल का कुछ समय पानी में बिताते हैं। इसलिए वह प्लैकटोनिक जीवों के लिए एक उपयुक्त खाद्य है। सुस्त सिस्टों का पानी में प्लैकटोनिक प्राणी और तलछट में नितलस्थ (benthos) जीवों के द्वारा खाद्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट का आरित्रपाद और मोलस्क के फिकल पैलेट में पाया जाना यह सूचित करता है कि वे इन्हीं सजीवों द्वारा खाये गये हैं। अरित्रपादों पर अनेक परिभक्षण (predation) प्रयोग किये गये हैं। यह प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि अरित्रपाद एक सिलेक्टिव परिभक्षक है और उनका चराईदर (grazing rate) उल्लेखनीय दृश्या कम है। अनेक प्रयोगों में देखा गया है कि स्क्रिपसेल्ला प्रजातियों के संपूर्ण व कैल्प्यभूत सिस्ट अरित्रपादों के फिकल पैलेटों में पाये जाते हैं, जो दर्शाता है कि उनका आरित्रपाद के द्वारा किया जाने वाला भक्षण उनपे कोई असर नहीं करता है। इसका कारण यह हो सकता है कि अरित्रपादकों के मुखांग डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट को तोड़ने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसी वजह से सिस्ट के कोशिकांतर्वस्तु (cell contents) पर पाचन एनजाइम्स कोई असर नहीं हो सकता।

जलक्षेत्र में विशिष्ट गुणधर्मों अर्थात् अवसादन (sedimentation) दर और कृत्रिम मैकेनिकल रिस्पेनशन की वजह से सिस्ट गहरे स्तरों में दफन हो जाते हैं अथवा तलछट की उपरी सतह पर पूर्ण निलंबित हो जाते हैं। इस निलंबित तलछट पर कवचप्राणी (shellfish) उनका भक्षण करते हैं। संशोधकों द्वारा किये गये कुछ शोधकार्य में प्रोटोशियासिअम रेटिक्यूलेटम (*Protoceratium reticulatum*) के जीवित सिस्ट ग्रीन मसल के जठर में पाये गये हैं। सिस्टमें पाये जाने वाले तेल और स्टार्च के कारण इन परिमाहकों के लिये वह एक मुत्यवान ऊर्जा स्रोत हैं। क्रॉसोस्ट्रिओ व्हरजेनिका (*Crassostrea virginica*) ऑस्टर के द्वारा खाये गये सिस्ट संपूर्ण परंतु मृत और अंशतः पतली श्लेष्मा (mucous) परत के साथ पाये गये हैं। डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट में विष विभन्न मात्रा में पाया गया है जिसकी मात्रा वनस्पतिक पेशियों से भी ज्यादा है। इस वजह से शेलफिश के द्वारा खाये जाने वाले डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट लकवाग्रस्त कवचप्राणी विष (Paralytic shellfish poison) का काम करते हैं।

डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट का सबसे ज्यादा भक्षण निक्षेपभोजी (deposit feeder) और निलंबित भोजी (suspension feeder) वर्गों के प्रजातियों द्वारा होता है। ये जीव तटीय क्षेत्र पंकिल तलछट (coastal muddy sediment) में नितलक भोजन का एक महत्वपूर्ण समूह माना जाता है। इसी पंकिल तलछट में डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट अधिकतम मात्रा में पाये जाते हैं। इस दिशा में किये गये संशोधन कार्य में कुछ विपर्यासी नतीजे पाये गये हैं। मेक्रोबेन्थास के फिकल पैलेट में पाये जाने वाले अलेक्झांड्रियम सिस्ट पर मेक्रोबेन्थास के भक्षण का असर नहीं होता। परंतु नैनोरिस लेविंगेटा

(*Naineris laevigata*) इस पॉलिकिट द्वारा भक्षण किये गये कुछ स्क्रिप्सेल्ला रोमोनी (*Scrippsiella ramonii*) प्रजाति के सिस्ट की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है।

कौम्प द्वारा किये गये संशोधन में कुछ रोचक परिणाम सामने आये हैं जिसमें पाया गया कि पॉलिकिट में भक्षण का स्क्रिप्सेल्ला लैक्रिमोसा (*Scrippsiella lachrymosa*) सिस्ट पे कोई असर नहीं होता परन्तु द्विकपाटी (bivalve) शूलचर्मी (echinoderm) काफी हद तक सिस्ट की संख्या कम करते हैं। इसके अलावा पैलिटायझेशन का स्क्रिप्सेल्ला लैक्रिमोसा सिस्ट के अंकुरण पर कोई असर नहीं होता। वास्तविक सिस्ट का अंकुरणदर पैलिट में ज्यादा पाया गया है, यह ये दर्शाता है कि पैलेट के अंदर होने वाली निम्नीकरण (degradation) प्रक्रिया सिस्ट के अंकुरण के लिए असरदार है। इसके अलावा पैलेट के अंदर संचित होने वाले पोषक तत्व सिस्ट के अंकुरण के लिए उपयोगी होते हैं। इस संशोधन के दौरान पाये गये नतीजे यह साधित करते हैं कि सिस्ट भक्षकजीवों में सिस्ट की पेशी भित्तिका को छेदने की क्षमता होनी चाहिए जिसकी वजह से भीतरी पेशीद्रव्य को पचाया जा सके। इसके अलावा सिस्ट का पाचन एन्जाइम्स के साथ का संपर्क समय भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से पाचन एन्जाइम्स को सिस्ट के पेशीद्रव्य के साथ अभिक्रिया के लिए ज्यादा समय मिलता है। उदा. स्क्रिप्सेल्ला लैक्रिमोसा सिस्ट अंकुरण प्रयोग से पहले अगर 6 घंटे तक एरेनिकोला मरिना के पाचन एन्जाइमों के संपर्क में रखा तो उसकी अंकुरण क्षमता में कमी पायी जाती है। इससे यह पता चलता है कि सिस्ट पाचनमार्ग से गुजरने के लिए लगने वाला समय और पाचनमार्ग की लंबाई सिस्ट पचन के लिए असरदार साधित होती है।


इसके अलावा बैथिक समूह की भोजन आदतों पर भी सिस्ट का भाविष्य निर्भर होता है। जिस तलछट में सतह भक्षक जीवों की (surface feeder) संख्या अधिक होती है, वहां पर सिस्ट फिकल पैलेट में अधिक मात्रा में पाये जाते हैं और उन्हें अंकुरण का मौका नहीं मिल पाता। अवसादण (sedimentation) की वजह से वे वापिस तलछट में दब जाते हैं। इसके विरुद्ध नितलस्थ आवास (benthic habitat) में निचली सतह पे भक्षण करने वाले प्रजातियां अधिक मात्रा में होती है, जो उपरी सतह पर अपना मलविसर्जित करती हैं। इस वजह से निचले अनाकर्सीक स्तरों में पाये जाने वाले सिस्ट उपरी सतह पर आते हैं, अगर फिकल पैलेट का विखंडन हो जाता है, तो सिस्ट को अंकुरण अवसर मिल जाता है। इससे साधित होता है कि जैव अस्तव्यस्ता (bioturbation) सिस्ट वितरण और सिस्ट अंकुरण को प्रभावित करती है।

इन प्रयोगों से यह साबित होता है कि डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट का भक्षण निम्नलिखित कारणों पर निर्भर होता है।

- भक्षक की भोजन आदतें।
- भक्षक के मुखांग की रचना।
- पाचन मार्ग की लंबाई।
- पाचन एन्जाइम्स की सिस्ट पर अभिक्रिया
- सिस्ट को भक्षक के पाचन मार्ग से गुजरने के लिए लगाने वाला समय।

लेकिन फिर भी कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरीत हैं

- क्या डायनोफ्लैजेलेट सिस्ट यह वाकही समुद्री प्राणीय प्रजातियों का भोजन है? या वह सिर्फ वैकल्पिक भोजन स्रोत है?
- क्या पाचन एन्जाइम्स सिस्ट के प्रसुप्तिकारकों (dormancy factor) की तीव्रता कम करते हैं?
- क्या सिस्ट भक्षक सिस्ट प्रजातियों विशेष (species specific) हैं?



दूरीकालीन सिस्टका जीवनवृक्त और उपका भवण