

विश्व का समुद्री नाइट्रोजन चक एंव उसका जलवायुवीय महत्व

राजेश अग्निहोत्री

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा- 403004

नाइट्रोजन (N) धरती एंव समुद्र की संपूर्ण जैविकी के लिये एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि यह अपने द्विपरमार्णवक रूप में अर्थात् N_2 अवस्था में हमारे वायुमंडल में पचुरता से विद्यमान है (लागभग 80%) परन्तु जैव उपयोगी नायट्रोजन की मात्रा अत्यन्त सीमित है। ऐसा इसलिये है क्योंकि सामान्य जीवों के लिये वायु में उपस्थित लिवर्धीय नाइट्रोजन को तोड़ पाना संभव नहीं है। यह कार्य अत्यन्त ही विशेष पकार के मुख जीवों यानि जीवाणुओं (Bacteria) द्वारा संपादित किया जाता है। ऐसे जीवाणु जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को जैव उपयोगी नाइट्रोजन यानि अणोनिया (NH_3) एंव नाइट्रेट (NO_3^-) में परिवर्तित करते हैं, नाइट्रोजन वंधक (N_2 fixers) कहलाते हैं। यद्यपि नाइट्रोजन वंधन का कार्य प्राकृतिक रूप से विद्युत तड़न (Electric-lightning) द्वारा भी निष्पादित होता है, परन्तु संपूर्ण भौगोलिक जैविकी के परिप्रेक्ष्य में विद्युत तड़न द्वारा परिवर्तित नाइट्रोजन की मात्रा अतिसूक्ष्म होती है। इसीलिये जैव उपयोगी नाइट्रोजन वंधक जीवाणुओं की मात्रा धरती तथा समुद्र दोनों ही में अत्यन्त मति सूक्ष्म है।

चूंकि धरती पर लगभग 75% क्षेत्र में जल (समुद्र) विद्यमान है अतः प्रस्तुत लेख में लेखक पाठकों का ध्यान समुद्री नाइट्रोजन चक (Marine Nitrogen Cycle) की ओर केन्द्रित करता चाहता है।

अंतरास्त्रीय व भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा समुद्री नाइट्रोजन चक का अध्ययन अत्यन्त गहनता से किया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण न केवल इसमें समावृशीत जटिलतायें हैं, वल्कि मानव मात्र को प्रभावित करने वाले वातावरण पर इसके परोक्ष एंव अपरोक्ष प्रभावों के कारण यह विषय भूमंडलीय ताप (Global warming) के परिप्रक्ष्य में भी अत्यन्त प्रासारिक है।

समुद्री नाइट्रोजन चक को समझने के लिये हमें समुद्रों में धुली हुयी ऑक्सीजन (dissolved O_2) की वितरण प्रणाली को समझना होगा। सामुद्रिक सतह तथा ऊपरी मिथित परतों में यद्यपि धुली हुयी आक्सीजन की मात्रा लगभग समान होती है (लागभग 200 μM) जो कि निचली परतों में कमशः कम होती चली जाती है। विश्व के मात्र तीन सामुद्रिक क्षेत्रों (उत्तरी एंव दक्षिणी पश्चांत के उण कटिवर्धीय सामुद्रिक क्षेत्र तथा अरब सागर) में यह मात्रा अधस्तलीय परतों में इतनी कम हो जाती है कि ऊपरी परतों से गिरने वाले कार्बनिक अवशेषों को सड़ने में सक्रिय जीवाणु, उन्हीं पदार्थों द्वारा निर्मुक्त जैव उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक (नाइट्रेट, NO_3^-) को उर्जा प्राप्त करने हेतु विखंडित करने लगते हैं।


जीवाणुओं द्वारा निष्पादित यह प्रक्रिया विनाइट्रोकरण कहलाती है तथा समुद्री नाइट्रोजन चक की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

विनाइट्रोकरण प्रक्रिया कई चरणों में होती है तथा इसके प्रमुख उत्पाद नाइट्रोज़ आक्साइड (N_2O) व स्थायी नाइट्रोजन (N_2) हैं जो कि गैस अवस्था में निर्मुक्त होकर वायुमंडल में पुनः मिल जाते हैं।


इनमें से एक उत्पाद नाइट्रोज़ आक्साइड है जो कि एक ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse gas) है यानि भूमंडलीय ताप की वृद्धि में समर्थ है। यद्यपि इसका प्रतिशत अनुपात अन्य ग्रीनहाउस सहायक गैसों (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 तथा मिथेन (CH_4) की तुलना में कम है। परन्तु इसका पृथ्वी के निचले वातावरण में

स्थायीत्व तथा सघन क्रियाशीलता की दृष्टि से यह कार्बन डाइ आक्साइड से लगभग 300 गुना अधिक हानिकारक है। चित्र 1 में समुद्री नाइट्रोजन की विभिन्न क्रियाओं का लाक्षणिक रूप से दर्शाया गया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु उत्परित क्रियाओं द्वारा जैव उपायोगी परिवर्तन तथा इस प्रकार से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थों के सङ्गे की प्रक्रिया में नाइट्रोजन का विभिन्न रूपों में निष्कासन व अन्ततोगत्वा वायुमंडल में अपने प्रारंभिक रूप में पुनरागमन, इस जटिल चक्र के उल्लेखनीय विन्दु हैं।

चित्र 1



चित्र 2



वित्र 2 में यह लाक्षणिक रूप से दर्शाया गया है कि मानव विकास की गतिविधियां विश्व नाइट्रोजन चक्र को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिये बढ़ते नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग तथा इसके कारण बढ़े हुये नाइट्रोकरण व विनाइट्रोकरण वायुमंडल में N_2O नाइट्रोजन ऑक्साइड को बढ़ाते हैं जो कि बढ़ते भूमंडलीय ताप में एक प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा मानव द्वारा जीवाश्म ईधन (Fossil fuel) का निरंतर बढ़ता प्रयोग वायुमंडल में वादलों की मात्रा बढ़ाती है जिसके फलस्वरूप आकाश में विद्युत तड़न की आवृत्ति (frequency) बढ़ती है जो कि पुनः नाइट्रोकरण की मात्रा को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर धरती पर हो रहे मानव हस्तक्षेप विश्व नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित है। वित्र 2 यह भी दर्शाता है कि बढ़ता नाइट्रोकरण तटीय क्षेत्रों में कैसे नाइट्रोजन प्रदुषण (Eutrophication) करने में कारक सिद्ध हो सकता है जो कि तटीय जैव सम्पदा के लिये हानिकारक है।

अतएव पश्च यह उठता है कि कैसे इस जटिल नाइट्रोजन चक्र की विभिन्न प्रक्रियाओं की दरों को समझा जाये तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम मानव हस्तक्षेप को पहचान (identify) व माप (measure) कर सकते हैं। नाइट्रोजन समस्थानिकों की विशुद्ध गणना इस कार्य में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुयी है। नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं।

^{14}N तथा ^{15}N जिनके नामिकों में प्रोटानों की संख्या तो समान परन्तु न्यूट्रोनों की संख्या भिन्न होती है। भूमंडलीय नाइट्रोजन में ^{14}N का अनुपात 99.63% तथा ^{15}N का अनुपात लगभग 0.37% है।

यह समास्थानिक यूं तो सभी प्रकार की भौतिक एंव रसायनिक क्रियाओं में समान दर से भाग लेते हैं, परन्तु कुछ विशेष जिवाणु उत्तेजित जैव क्रियाओं में (जिसे समुद्र सतह पर होने वाले पकाश संश्लेषण (Photo systhesis) ^{14}N की अपेक्षा प्राथमिकता मिलती है। इस तरह से इन क्रियाओं द्वारा वने उत्पादों में नाइट्रोजन समास्थानिकों के अनुपात में विभिन्नता (Isotopic fractionation) प्रेषित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पाद समास्थानिक विभिन्नता को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों (Mass-spectrometers) द्वारा आवश्यक मुनिश्चितता (precision) से मापा जा सकता है। नाइट्रोजन समास्थानिकों की गणना निम्नलिखित रूप में की जाती है।

$$\delta^{15}N = \frac{(^{14}N)}{(^{15}N)} - 1 \times 1000$$

$$\frac{(^{15}N)_{\text{std.}}}{(^{15}N)}$$

इसे डेल्टा का पैमाना कहते हैं तथा इसे प्रतिशत में न कहकर प्रति हजार (%) में मापा जाता है। उल्लेखनीय है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डेल्टा पैमानेपर शुन्य माना गया है।

ऐसा कई विस्तृत शोधों द्वारा ज्ञात हुआ है कि नाइट्रोजन समस्थानिकों में सर्वाधिक विभिन्नता प्राकृतिक अधस्तलीय (subsurface) विनाइट्रोकरण प्रक्रिया द्वारा कारकों (Reactants) में प्रेषित होती है। जो कि विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समुद्री सतह पर वनने वाले जैविक उत्पादों (Biological productivity) में समाहित हो जाती है।

विश्व समुद्र के न्यून आक्सीजन क्षेत्रों (Oxygen minimum zones) जहां अवसादिता की दर अपेक्षा कृत अधिक होती है, यही नाइट्रोजन समास्थानिकों की विभिन्नता अवसादों में कमवन्दु तरीके से प्रेषित हो जाती है।

अरव सागर के (Sediment) अवसादों के प्रणाली नाइट्रोजन समास्थानिकों के अनुपात की गणनाओं ने पृथ्वी पर होने वाली कई दीर्घकालिन (long term) क्रृतु परिवर्तनों के कारकों के बारे में उल्लेखनीय जानकारी दी है (Altabet et. al. 1995, 2002) इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कड़े शोध से यह ज्ञात हुआ है कि अरव सागर के पूर्वी किनारे (Eastern Arabian Sea) पर भारतीय सीमा से सेट हुये अधस्तलीय जल में होने वाले विनाइट्रीकरण का अल्पकालिक (Short term) क्रृतु परिवर्तन पर कितना सीधा प्रभाव पड़ सकता है (Naqvi et al. 2000).

भारतीय कृषि योग्य भूमि पर निरंतर बढ़ते नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग, बढ़ती जनसंख्या व इससे उत्पन्न अपशिष्टों के निकटस्थ तटीय समुद्री जल में पलायन से पाकृतिक अधस्तल विनाइट्रीकरण कैसे प्रभावित हो सकता है तथा इससे हमारे भूमंडलीय ताप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे रसायनिक वैज्ञानिक इन प्रश्नों को समझने की सतत चेष्टा कर रहे हैं।

उदाहरण के लिये हमारे वर्ग के वैज्ञानिकों ने हाल ही के एक शोध द्वारा यह दर्शाया है कि गोवा के तटीय क्षेत्र के अवसादों में नाइट्रोजन समास्थानिक गणना द्वारा पिछली शताब्दी में हुये मानव हस्तक्षेप के प्रारम्भ को विच्छिन्न किया जा सकता है (Agnihotri et.al. 2008).

अतः विश्व नाइट्रोजन चक की विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं की समझने तथा हाल के कुछ दशकों में हुये मानव हस्तक्षेप को विच्छिन्न व परिमाणित करने में नाइट्रोजन समास्थानिकों का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस संक्षिप्त लेख में लेखक का उद्देश्य पाठकों को विश्व के समुद्री नाइट्रोजन चक में निहित जटिलताओं से अवगत कराना नहीं वरन् इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पाठकों की अभिरुचि बढ़ाना है।

संदर्भ

अग्निहोत्री, आर. सी. वी. कुरीयन, माइकल फरनेन्डस, के.रेशा, डब्ल्यू.डी. सोजा, एम.डब्ल्यू.ए नकदी (2008)

उपसतह विनाइट्रीकरण की परिवर्तनशीलता एवं पिछले सात सदियों से तटीय पूर्वी अरव समुद्र में सतह उत्पादकता, द होलोमिन (इन प्रेस) 18 (5), 755-764.

एलटावेट, एम ए फेनकोइस आर मूरे डी डब्ल्यू प्रेल डब्ल्यू.एल (1995) अरव सागर की तलछट 45N/14 N रेशन में जलवायु संवर्धित परिवर्तन विनाइट्रीकरण। प्रकृति 373 ,506-509

एलटावेट एम ए हिंगोन्सन एम जे मूरे डी डब्ल्यू (2002) अरव सागर में वायुमंडलीय कार्बनआक्साइड

विनाइट्रीकरण सहस्राब्दी के पैमाने पर परिवर्तन का असर, प्रकृति 415 , नेचर 415, 159-162

नकदी एस डब्ल्यू ए जयकुमार डी ए नार्वेकर पी वी नाइक एच शर्मा वी वी एस एस डी सोजा डब्ल्यू जोसेफ एस जोर्ज एम डी (2002) भारतीय महाद्वीपीय शैल्फ पर तेज अनॉक्सिता समुद्री उत्पादन में नाइट्रोजन का बढ़ना, नेचर 408, 346-349