

“समुद्री नील हरित शैवाल - नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा के सम्भाव्य स्रोत”

संध्या सधानन्दन, स्वाति जोशी एवं तानाजी जगताप

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा- 403004

सारांश:

जीवाश्मीय ईंधन के अवक्षय की बढ़ती हुई दर तथा पर्यावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड के बढ़ते हुए अस्वार में उनके योगदान के कारण भविष्य में परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर रहना असम्भव सा प्रतीत होता है। वर्तमान में जैवईंधन स्थलीय पादपों (जैसे-तौरिया, सोयाबीन, ताड़, मक्का, गन्ना आदि) से प्राप्त किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश तेलीय फसलों द्वारा प्राप्त जैवडीजल वास्तविकता में परिवहन ईंधन की मांग के छोटे से अंश की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हुए खाद्यान्नों के मूल्यों के साथ, कृष्य की भूमि को जैवईंधन की उपज हेतु बदलने से भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। परन्तु शीघ्रता पूर्वक उभरती हुई अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या वृद्धिदर ऊर्जा के उपयोग को कई गुना बढ़ा देते हैं। अतः पर्यावरण एवं अधिक स्थिरता के लिए नवीकरणीय स्रोत अत्यावश्यक है। नवीकरणीय स्रोत के रूप में सूक्ष्मशैवालों द्वारा (मुख्यतः सायनोवैक्टिरिया) उत्पादित जैवईंधन मात्र अकेला कार्बन उदासीन स्रोत है जो कि ऊर्जा की इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति में सक्षम है। प्रस्तुत लेख नील हरित शैवाल (सायनोवैक्टिरिया) को जैव हाइड्रोजन, जैवडीजल, जैवविद्युत एवं एथेनॉल के रूप में ऊर्जा के भावी स्रोत के रूप में सम्भावनाओं का वर्णन करता है।

परिचय :

वर्तमान में प्रतिदिन विश्व में करीब 3.36 अरब गैलन (80 लाख बैरल) तेल की खपत होती है। विश्व में तेल का यह बढ़ता हुआ उपयोग एवं सिकुड़ती हुई जीवश्मीय ईंधन की सम्पूर्ति ऊर्जा की इस समस्या को कई गुना बढ़ा रहे हैं। (कम्प्ले 2007)। साथ ही साथ वृहद पैमाने पर कार्बन-डाई-ऑक्साइड का वायुमण्डल में उत्सर्जन, वैकल्पिक शोधित्र ईंधन का नवीकरणीय स्रोत द्वारा उत्पादन में वृद्धि को और भी आवश्यक बना देते हैं। जीवाश्मीय ईंधन पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता इन क्षीयमाण स्रोतों के लिए आर्थिक विदारण, राजनैतिक उपद्रव एवं युद्ध की बहुत बड़ी सम्भावना को खड़ा कर देती है। भू-मण्डलीय जलवायु के बदलने के खतरे का सबसे बड़ा कारण वायुमण्डल में बढ़ती हुई कार्बन -डाई-ऑक्साइड की मात्रा है, जो कि इन जीवाश्मीय ईंधन के दहन से निकलती है। अतएव, योग्य वैकल्पिक ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास प्रारम्भ किए जा चुके हैं। जैसे — जैवडीजल, एथेनॉल, हाइड्रोजन या जैवईंधन कोश जैसी युक्ति (गौगोस्कस, 2006

परम्परागत जैवईंधन का उत्पादन एवं पर्यावरण:

“रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ 2007” के अनुसार सन्2007 में जैवईंधन (एथेनॉल एवं जैवडीजल) का उत्पादन 53 अरब लीटर था जो कि सन्2005 से 43 प्रतिशत अधिक है। सन् 2007 में एथेनॉल का उत्पादन विश्व की कुल पेट्रोल खपत 1300 अरब लीटर का 4 प्रतिशत था। जैवडीजल का वार्षिक उत्पादन तो सन्2006 की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी अधिक था। जैवईंधन, विशेष रूप से जैवडीजल एवं एथेनॉल के उत्पादन के लिए परम्परागत फसलों में तौरिया (Rapeseed), सोयाबीन, ताड़, मक्का, गन्ना कसावा इत्यादि सम्मिलित हैं। जैवडीजल को सामान्यतः स्वच्छ, पारिक एवं नवीकरणीय वैकल्पिक ईंधन कहा जाता है। परन्तु भूमि पर कुप्रभाव डालने वाली इसकी वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया को देखें तो इसे पृथ्वी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्रोत का नाम दे सकते हैं। वृहद पैमाने पर जैवईंधन के उपयोग से होने वाला खतरा प्रमुख रूप से भूमि से


वनोन्मूलन की वजह से है, क्योंकि फसलों के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।

खाद्य फसलों से जैवईंधन की और रूख करने के सभी उपगमन असफल होते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि खाद्य उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि के लिए उनमें स्पर्धा रहेगी एवं जैव ईंधन का उत्पादन सीमित है, जिससे कि अन्ततः खाद्यानों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी (रिट्ज्मान, 2008)।

प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्मजीवों द्वारा सूर्य के प्रकाश को जैवडीजल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी एक वैकल्पिक उपगमन हो सकता है।

सूक्ष्मशैवाल की परम्परागत ईंधन फसलों पर श्रेष्ठता:

सूक्ष्मशैवालों को उनकी कम जटिल संरचना, तीव्रवृद्धि दर एवं कुछ जातियों में पाये जाने वाले उच्च तैलीय अंश, और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। समकालीन शोध की गणना अनुसार इनमें ताड़ रोपण की अपेक्षा करीब 25 गुना एवं तौरिया की अपेक्षा 100 गुना अधिक उपज होती है, जो कि युरोप में जैव डीजल के लिए सामान्य फसलें हैं (तालिका-1)। समान ऊर्जा प्राप्ति के लिए स्थलीय फसलों से भिन्न, सूक्ष्म शैवाल द्वारा जैवडीजल की उपज प्रति क्षेत्रफल अधिक होती है। यहां तक की शुष्क एवं गर्म क्षेत्रों में भी इनकी कृषि की जा सकती है। फलस्वरूप ना तो पर्यावरण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है ना ही खाद्य उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित CO_2 का शैवाल संवर्धन संयंत्र में जैवयौगिकीकरण द्वारा जैवडीजल का उत्पादन किया जाता है जो कि वैकल्पिक शोधक है (कुरेवोजा एवं कुकुलज, 2004) चित्र 1।



चित्र 1 शैवाल द्वारा जैवडीजल उत्पादन के साथ जीवाश्मीय ईंधन दाहक शक्ति संयंत्र द्वारा CO_2 के उत्सर्जन का सरलीकृत आरेख (संदर्भ : टॉमिस्ताव एवं नेनाद, 2004)

जैवईंधन : भारतीय संदर्भ


जैवईंधन के उत्पादन में 0.30 अरब लीटर एथेनॉल एवं 0.03 अरब लीटर जैवडीजल का उत्पादन करते हुए भारत का विश्व में आठवां स्थान है। पेट्रोल के 10 प्रतिशत सम्मिश्रण के लिए करीब 500 (मिलियन) खरब लीटर एथेनॉल की भारत में आवश्यकता है। (चन्देल, 2007)। सन् 2001 में ऊर्जा की मांग एवं गणना अनुसार कुल ऊर्जा का 3.5 प्रतिशत भाग का उपयोग करते हुए भारत का छठा स्थान था, तब से मांग में अनवरत रूप से वदोती ही रही है।

भारत, कुल उपयोग में आने वाले तेल में से लगभग 70% तेल आयात करता है जिसके फलस्वरूप देश को बढ़ती हुई तेल की कीमत, अनिश्चतता एवं जैवईंधन के उपयोग से होने वाले पर्यावरण संकट की मार झेलनी पड़ रही है। इसी संदर्भ में जैवऊर्जा के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता ऊर्जा के रूप में जैवऊर्जा को भारत में स्थापित करता है। जैवऊर्जा के उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से जैवडीजल एवं एथेनॉल में ऊर्जा स्रोत के रूप में आर्थिक विकास की भारत में सम्भावनाएँ हैं (पारीख, एवं वालिया, 2001)। एथेनॉल के लिए भारत में कच्चेमाल के रूप में शर्करा उद्योग से प्राप्त मोलेसेज प्रयुक्त होता है। जैवडीजल के उत्पादन के लिए जैट्रोफा करकस में अत्याधिक सम्भावनाओं को देखते हुए भारतीय योजना आयोग, विभिन्न सरकारी शाखाओं एवं देशव्यापी कार्य कर्मों द्वारा वंजर एवं अकृष्य भूमि पर इनकी कृषि को प्रोत्साहन दे रहा है। भारत में जैट्रोफा पर निवेश करने वाली कम्पनियों में, डी1 ऑइल, गोदरेज एगोवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, कोच्चि रिफायनरीज लिमिटेड, वायोहेल्थकेयर प्राइवेट, द सर्दर ऑनलाइन वायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, नेचुरल वायोएनर्जी लिमिटेड एवं रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (लेले, 2006)। भारत में करीब 110 लाख हैक्टेयर भूमि पर जैट्रोफा की कृषि की योजना है। भूमि की कमी वाले देश में यह भूमि का दिकपरिवर्तन ग्रामीण आजीविका एवं ग्रामीण पारितंत्र पर गम्भीर प्रभाव डाल सकता है। अतएव सूक्ष्मशैवाल द्वारा उत्पादित जैव ऊर्जा ही भारत की इस बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग की पूर्ति का सर्वोचित हल है।

प्रकाश संश्लेषण को हम मूल रूप से सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा (ईंधन) में रूपान्तरित करने वाला ब्लूप्रिन्ट मान सकते हैं (कूज, 2005)। सूक्ष्म शैवाल विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय जैवईंधन प्रदान करते हैं, जिनमें सूक्ष्मशैवालीय तेल से उत्पन्न जैवडीजल, प्रकाश जैविकीय प्रक्रिया द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन, जैवविद्युत एवं एथेनॉल सम्मिलित हैं।

जैवहाइड्रोजन उत्पादन:

वर्तमान में प्रकाश जैविकीय हाइड्रोजन उत्पादन, प्रचलित “नवीकरणीय ऊर्जा” में से एक है। जैविकीय हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे रोचक पहलू हाइड्रोजन का स्रोत है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि जल है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सायनोबैक्टीरिया सौर ऊर्जा से स्वपोषी परिस्थितियों में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की क्षमता के कारण प्रकाश जैविकीय हाइड्रोजन उत्पादन तंत्र के विकास के प्रमुख दावेदार है (सिंगकोव, 1999)। सायनोबैक्टीरिया एक ऑक्सीजनित प्रकाश स्वपोषी पूर्व केन्द्रकीय जीवों का विस्तृत एवं भिन्न समुह बनाते हैं जिसमें कि अधिकतर (एनाविना सिलिंड्रिकल, ऑसिलेटोरिया लिमासा, केलोथिक्स स्कोपुलोरम, केलोथिक्स मेम्बसिया, सायनोथ्रेसी प्राजाति, एनाविना वेरिआविलीस, नॉस्टॉक मस्कोरम, स्टॉक लिक्विआ, नॉस्टॉक लम्पून, सिनेकोकस जाति) हाइड्रोजन उत्पन्न करने में सक्षम हैं (चित्र 2)।



चित्र 2 : जैव हाइड्रोजन उत्पादन में उपयोगी कुछ सायनोजीवाणु जातियाँ

संवर्धन परिस्थितियों की विशाल पंक्ति में सायनोवैकटीरिया के करीब 14 वंशों में हाइड्रोजन उत्पादन होता है (दत्ता इत्यादि, 2005)। हाइड्रोजन उत्पादन सर्वप्रथम तंतुमय सायनोवैकटीरिया एनाविन में जैकसन एवं एल्क्स (1896) द्वारा सूचित किया गया था (प्रिंस एवं खेशी, 2005)।

हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रक्रिण्व तंत्र:

सायनोवैकटीरिया, प्रकाश स्वपोषी मुक्ष जीवाणु होते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार के प्रक्रिण्व उपयोग में लाते हैं। प्रथम नाइट्रोजिनेज है जो कि तन्तुमय सायनोवैकटीरिया की विषमपुट्टी में पाया जाता है, जब कि उन्हे नाइट्रोजन सीमाकारीय परिस्थिति में उगाया जाता है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के अमोनिया में यौगिकीकरण उपउत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। सायनोवैकटीरिया में पाये जाने वाला द्वितीय हाइड्रोजन उपापच प्रक्रिण्व हाइड्रोजिनेज है, जो कि दो भिन्न प्रकार के एवं भिन्न जाति मे पाये जाते हैं। इनमें पहले ग्राह्य हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करता है, तथा दुसरा हाइड्रोजिनेज, "उत्कमणीय हाइड्रोजिनेज" जो कि या तो हाइड्रोजन ग्रहण करता है या फिर उत्पन्न। नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण केवल अनॉक्सीय परिस्थितियों में ही हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं (दत्ता, 2005)।

सायनोवैकटीरिया में हाइड्रोजन उपापचयन में सम्मिलित प्रक्रिण्व प्रभेद के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ प्रभेदों में ग्राह्य एवं उत्कमणीय दोनों प्रकार के हाइड्रोजिनेज उपस्थित होते हैं जबकि कुछ में इनमें से केवल एक उपस्थित हो सकता है। इसलिए उपयोग में लेने वाले प्रभेद को पहले आण्विक स्तर पर अनुसंधान कर लेना चाहिए (शुल्टज इत्यादि 2004)। हाइड्रोजिनेज जातिवृत्त; असमान मुक्ष जीवों में उपस्थित होता है परिणामतः विभिन्न मुक्ष जीवों में हाइड्रोजन उत्पादन की सम्भावना खोजना एक सक्रिय अनुसंधान का विषय है। (टर्नर इत्यादि 2008)।

हाइड्रोजन उत्पादन को विभिन्न प्राचल अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करते है और अनुकूलतम हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सायनो जीवाणुओं के विभिन्न जातियों की आवश्यकताएँ भी अलग-अलग होती है। बहुत सी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसे प्रकाश तापमान लवणता पोषक तत्वों की उपलब्धता गैसीय वातावरण इत्यादि भी हाइड्रोजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आन्तरिक कारक जैसे आनुवांशिक घटक या सायनोवैकटीरिया में उपस्थित संवेदनशील प्रोटीन भी हाइड्रोजन उत्पादन को प्रभावित करते हैं। विषमपुट्टीय सायनोवैकटीरिया काथिक कोशिकाओं युक्त सायनोवैकटीरिया से हाइड्रोजन उत्पादन में अधिक मक्षम होते हैं। (दत्ता इत्यादि 2005)।

अनुसंधानिक अवधारणाएँ एवं स्थिति :

सायनोवैकटीरिया एवं हरे शैवाल सूर्य प्रकाश के वर्णक्रम का लगभग 40-45% अवशोषित कर सकते हैं तथा इसमें से भी हाइड्रोजन उत्पादन की दक्षता करीब 10-13% होती है। ये दक्षता अधिक समय तक साध्य नहीं है अतः सभी सीमाकारी कारकों को समझने एवं उन्नत क्रियाविधि के अनुसंधान की आवश्यकता है (टर्नर, 2005)। सिंगाकोव इत्यादि (1999) ने प्रकाश जैविकीय रिएक्टर में एनाविना वेरिआविलिस एवं इसके उत्परिवर्ती pk84 द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन का गण संवर्धन कर अध्ययन किया। उनके अनुसार सायनोवैकटीरिया के उत्परिवर्ती की हाइड्रोजन उत्पादन की दक्षता को नाइट्रोजिनेज की क्रिया को बढ़ा कर बढ़ाया जा सकता है। नाइट्रोजिनेज की क्रिया विषमपुट्टी की वारम्बारता को बढ़ाया जा सकता है। दुसरी अवधारणा एक कोशिकीय सायनोवैकटीरिया सिनेकोसिस्टिस जाति द्वारा जैव हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अंधेर में नाइट्रोजन सीमाकारी परिस्थिति में हाइड्रोजन उत्पादन दर काफी अधिक होती है तथा कृत्रिम इलेक्ट्रॉन दाताओं को जोड़ने पर यही दर 10 गुना बढ़ जाती है (शुल्टज इत्यादि, 2004)।

जैवडीजल उत्पादन:

आजकल सूक्ष्मजैविक जैवडीजल ने निवेश हेतु ध्यान आकृष्ट करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्मजीवों के विभिन्न प्रकारों के उपयोग एवं उनके वृहद पैमाने पर उत्पादन के महत्वपूर्ण विषय ने वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं को आमने-सामने ला खड़ा किया है। वर्तमान में अधिकतर प्रयास प्रकाश संश्लेषी शैवाल एवं नील हरित शैवालों पर केंद्रित है। ये दोनों प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्मजीव उच्चस्तर की लिपिड का संग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि इन दोनों में काफी विभिन्नताएँ हैं परन्तु जैवडीजल के उत्पादन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शैवाल वडी मात्रा में लिपिड का संग्रहण संग्राहक पदार्थ के रूप में केवल तनाव एवं धीम वृद्धि को समय ही कर सकते हैं। जब कि नीलहरित शैवाल लिपिड का संचय थायलेकोइड झिल्ली में करते हैं जो कि उच्चस्तर के प्रकाश संश्लेषण एवं तीव्र वृद्धि दर को भी सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषी जीव उच्च दर से लिपिड उत्पादन के लिए प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त नीलहरित शैवाल के पूर्व केन्द्रकीय होने की वजह से इन्हे अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा मुकेन्द्रीय शैवाल की अपेक्षा सरलता से उन्नत किया जा सकता है (वरमास, 1998)। उदाहरण के लिए वरमास ने सिनेकोसिस्टिस के एकलजीन उत्परिवर्ती का निर्माण किया जो कि अपने शुष्कभार का लगभग 50% लिपिड के रूप में संग्रह कर सकता है। कुछ शैवाल (मुकेन्द्रकीय) एवं नील हरित शैवाल (पूर्वकेन्द्रकीय) में लिपिड की मात्रा अधिक होती है। समुचित परिस्थितियों में, ये प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्मजीव जैवडीजल के लिपिड का उत्पादन किसी भी पादपत्र से 100 गुना अधिक उपज प्रति क्षेत्रफल कर सकते हैं (तालिका-2)।

तालिका 1 सूक्ष्मशैवाल एवं सामान्य स्थलीय पादपों द्वारा जैवडीजल उपज हेतु जैव तेल की उपज की तुलना (टॉमिस्लाव एवं नेनाद 2004)

पादप	सूक्ष्मशैवाल	सोयाबीन	तौरिया	जैदाफ	ताड़
$m^3/km^2/y$	> 15000	35-45	100-130	160	580
bbl/acers/y	> 380	0,90-1,15	2,55-3,30	4,10	14,80
GJ/km ² /y	>500000	1165-1500	3330-4330	5330	19315

गुण धर्म	उच्च लिपिड पादप	प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्मजीव
द्विगुणन समय	अपेक्षाकृत लम्बा/ सप्ताह	अपेक्षाकृत छोटा/~ 1दिन
कृष्य भूमि की आवश्यकता	हां	नहीं
कृषि उत्पादन	मौसमी या फसल प्रतिवर्ष	सतत
जैवभार गुणवत्ता होमोजिनेटी	हेटरोजीनस, पर्ण, तना, बीज, मूल इत्यादि	होमोजिनेस
जैवभार गुणवत्ता लिगोमेल्युलोज	हां	नहीं
जल उपभोग	उच्च बायोमैसर्जन के कारण	कम से मध्यम
खाद उपभोग	उपभोग दर उच्च	पापक तत्व केवल एवं रिसायकृत के अनुसार
लिपिड लब्धि	कम < 1000 लाइब्र/हेक्टर प्रतिवर्ष	उच्च ~ 100,000 लाइब्र / हेक्टर प्रतिवर्ष

- अ) उच्च लिपिड पादप - सोयाबीन एवं सूर्यमुखी
 व) प्रकाश संश्लेषी - सूक्ष्मजीव - शैवाल एवं सायनोजीवाणु
 क) लब्धि प्रति इकाई क्षेत्रफल हर्वर इत्यादि के अनुसार (2006)

तालिका 2 - जैवडीजल के निर्माण हेतु लिपिड पदार्थों के स्पेन के रूप में पादप एवं प्रकाशसंश्लेषी सूक्ष्म जीवों की तुलना।

साथ ही साथ अलिपिड जैवभार को भी मीथेन, हाइड्रोजन या विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। सम्भवतः सायनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पादित जैव ऊर्जा हमारे समाज के उपयोग के महत्वपूर्ण अंग जीवशुभय ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए यथेष्ट एवं सर्वोत्तम विकल्प है (गिडुमान, 2008)। जैवडीजल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जैवडीजल के उत्पादों की लागत भी प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए।

एथेनॉल उत्पादन:

जीवाशुभय ईंधन की आवश्यकता में कमी लाने के लिए एक उपाय विभिन्न फीडस्टॉक के जैवरूपान्तरण द्वारा एथेनॉल का उत्पादन है। परम्परागत तरीके से एथेनॉल का उत्पादन अपेक्षाकृत महंगे फीडस्टॉक जैसे धान्यस्टार्च एवं इक्षु शर्करा के यीस्ट किण्वन द्वारा होता है। कुछ शैवाल एवं सायनो बैक्टीरिया में अदीप्त एवं जैव तकनीकी में विकास को साथ जैवभार में उपस्थित बैक्टीरियल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने के लिए कृषि एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं के नए तंत्र विकसित किए गए हैं। उच्च प्रकाश संश्लेषण की दक्षता सीमित पोषक तत्वों की आवश्यकता, तीव्र वृद्धि दर एवं अकार्बनिक कार्बन को परिवहन की क्षमता सायनोबैक्टीरिया को एथेनॉल संश्लेषण का उपयोगी माध्यम बनाते हैं। परन्तु इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि एथेनॉल उत्पादन में ही बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती है अतः परिवहन ईंधन के रूप में इनका बहुत कम लाभ मिल पाता है (प्रिन्स एवं खेशगी 2005)।

स्वपोषी जीव जैसे शैवाल या सायनो जीवाणु द्वारा प्रकाश संश्लेषी कार्बन यौगिकीकरण द्वारा सीधे ही जैव संश्लेषण से एथेनॉल की लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार एथेनॉल संश्लेषण पथ में कार्बन प्रवाह में परिवर्तन कर, सवस्ट्रेट स्तर को अधिकतम किया जा सकता है। इस प्रकार प्रणाली में पोषी कोशिका के उपापचयन में आनुवांशिक परिवर्तन एवं वृद्धि परिस्थितियों में फेर बदल कर अनुकूलतम परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के साथ ही साथ एथेनॉल प्राप्ति या पृथक्करण की तकनीक में सुधार से सरल प्रकाश स्वपोषी जीवों द्वारा औद्योगिक स्तर पर इथेनॉल उत्पादन सम्भव हो सकता है (डिंग एवं कोलेमान 1999)।

भविष्य के लिए रणनीति:

निकट भविष्य में सायनो बैक्टीरिया एवं शैवाल आनुवांशिक रूप से परिवर्तित हो कोशिकीय कारखाने में बदल जाएगी जो कि बिना जैवमात्रा की उपज एवं प्रक्रिया की आवश्यकता के मूल्यवान पदार्थ प्रदान करेंगे। सूक्ष्मशैवालीय जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्राथमिक रूप से आनुवांशिक एवं उपापचयी अभियांत्रिकी तथा उन्नत प्रकाश जैविकीय रिएक्टर अभियांत्रिकी की आवश्यकता है। आनुवांशिक एवं उपापचयी अभियांत्रिकी, सूक्ष्मशैवालीय जैव ईंधन के आर्थिक उत्पादन पर बहुत प्रभाव रखती है। आप्तिक स्तर पर अभियांत्रिकी द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वृद्धि, जैवभार की वृद्धि दर में वढोतरी, जैव भार में उच्च तैलीय अंश, शीतलन के खर्च को कम करने हेतु उन्नत ताप सहनता, प्रकाश स्तर के बढने के साथ-साथ लगातार वृद्धि (प्रकाश संतृप्तता के गुण को कम कर) एवं प्रकाश अवरोधन को कम करने की प्रबल संभावनाएँ हैं (किस्टी 2007)।

औद्योगिक पैमाने पर जैवईंधन के उत्पादन के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साथ-साथ जैव रिएक्टर अभियांत्रिकी भी अति आवश्यक है। प्रकाश जैव रिएक्टर का औद्योगिक स्तर पर जैवभार के उत्पादन के लिए उपयोग अपेक्षाकृत प्रभावी परिणाम देता है (किस्टी, 2007)। नेडवल इत्यादि ने (2008) प्लेट क्यूवेट प्रकाश जैवरिएक्टर की रूपरेखा एवं उपयोग का वर्णन किया जिसमें कि संवर्धन प्रदीप्त उपयुक्त नियंत्रण, तापमान, pH एवं गैसीय संघटन का चार दिवारी युक्त फ्लुओरो मीटर एवं डेंसिटीमीटर द्वारा समायानुसार संचालन होता है। प्रकाश जैव रिएक्टर का प्रदर्शन एक कोशिकीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण सायनो बैक्टीरिया सायनोथेसी जाति का उपयोग करके किया गया। यह नवीन प्रकाश जैवरिएक्टर, प्रकाशस्वपोषी सूक्ष्मजीवों के प्रणाली जीव विज्ञान एवं जैवतकनीकी के अध्ययन एवं उपयोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। क्लेयर इत्यादि (2008) ने प्रकाश

संश्लेषी सायनो वैक्टिरिया के प्रभेदों में सिने कोकस एवं सायनोथेसी वंश का भीसोपोरस सिलिक नेटवर्क में सम्पुटन कर नवीन प्रकाश जैव रिएक्टर की सम्भावना प्रदर्शित की संकर जैलतंत्र अव कोशिकाओं की वढती हुई जैव सक्रियता एवं जीवन को द्वारा दक्षता के वढने की आशा करता है।

सूक्ष्म शैवालीय जैवतकनीकी के भविष्य के लिए अभी भी वृहद पैमाने पर प्रकाश जैव रिएक्टर का विकास बाकी है, जिससे कि पूरी तरह निर्जमीकृत, कम से कम संदूषण की सम्भावना के साथ निश्चित एवं अनुकूलतम परिस्थिति में संचालित किया जा सके। परन्तु अभी भी प्रकाश जैवरिएक्टर के साथ प्रकाश पुनः वितरण प्रणाली, प्रक्रिया अभियंताओं के लिए एक चुनौती होगी (जेंसन आदि 2003)।

निष्कर्ष:

विश्व की तीव्र एवं लगातार वढती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण एवं पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों का दोहन वैकल्पिक ऊर्जा को स्रोतों विकास बिना अव संभव नहीं है। जैवईंधन विकास समिती (2000) के ब्यौरे अनुसार सन् 2050 तक कुल भुमण्डलीय ऊर्जा का लगवग एक तिहाई $\frac{1}{3}$ भाग का उपयोग भारत कर लेगा। तेल के ऊंचाईयों को छूते मुल्य एवं उभरती हुई भारतीय आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए नवीकरणीय कार्वन उदासीन, परिवहन ईंधन जैसे जैव हाइड्रोजन जैवडीजल, जैवविद्युत एवं एथेनॉल का उत्पादन पर्यावरण एवं आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यकता है। भारत सरकार बड़े पैमाने पर जैवडीजल की फसलों जैसे जैट्रोफा व पोंगोनिया की कृषि के लिए सहायता प्रदान करती है। दुर्भाग्यवश, तैलीय फसलों द्वारा प्राप्त जैवडीजल वास्तविकता में परिवहन ईंधन की मांग के छोटे से अंश की भी पूर्ति नहीं कर पाते है। वलिक कृषियोग्य भूमि पर खाद्य फसलों के साथ स्पर्धा करने के कारण खाद्य मुल्यों में वृद्धि हो रही है। फलतः सूक्ष्म शैवाल विशेष रूप से सायनोवैक्टिरिया ही वढती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने में सक्षम एकमात्र नवीकरणीय स्रोत है।

विषमपुष्टिय सायनोजीवाणु, भविष्य के लिए मूल्यवान नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैव हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रबल दावेदार सिद्ध हो चुके है। यद्यपि औद्योगिक पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीक अभी भी अनुपलब्ध है। जैवरसायन स्तर पर इतना सुधार कि हाइड्रोजन उत्पन्न करने की दर एवं क्षमता जैवविद्युतीय प्रणाली तक पहुंचे वर्तमान में पुर्वपक्षित चुनौती है। एक कोशिकीय सायनोजीवाणुओं के प्रयोग से सूक्ष्म जैविक ईंधन सैल द्वारा जैवविद्युत के उत्पादन में अभी भी सम्भाव्य तकनीकी में अनुसंधान की आवश्यकता है। एथेनॉल का उत्पादन, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं की दक्षता को वढा कर प्रभावी रूप से वढाया जा सकता है। जीवाश्मीय डीजल को पूरी तरह से विस्थापित करने का एक मात्र उपाय जैव डीजल का स्रोत सूक्ष्म शैवाल है। पेट्रोल-डीजल से प्रतिस्पर्धा के लिए सूक्ष्म शैवाली जैवडीजल की आर्थिक व्यवस्था में प्रभावी रूप से सुधार आवश्यक है। यह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक एवं उपापचयी अभियांत्रिकी तथा प्रकाश जैव रिएक्टर अभियांत्रिकी के द्वारा शैवालीय जीवविज्ञान में सुधार द्वारा सम्भव है। जैव ईंधन के निर्माण में सूक्ष्म शैवालो के द्वारा वातावरण में कार्वन-डाई-ऑक्साइड को एकत्रण की समस्या में भी जैव यौगिकी करण द्वारा कार्वन को विविक्तभवन से कमी आएगी। सूक्ष्म शैवालों में जैवईंधन की उत्पादन की प्रमुख कमी पूंजी निवेश एवं तकनीकों का प्रारंभिक स्तर पर होना है। इसके वावजूद भी सायनो जीवाणुओं को भविष्य के ऊर्जा स्रोत माना जा सकता है।

आभार:

लेखक हिन्दी लेख के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला के डॉ. निदेशक श्री सतीश शेतये का आभार व्यक्त करते है।

सन्दर्भः

- रिन्यूएबल, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, 2007. रिन्यूएबल ऊर्जा पोलिसी नेटवर्क फॉर द 21^{स्ट} सेंचुरी ।
केवेल केंथरिन ई. (2007) वायुलोजिकल फ्यूलस फॉम माइक्रोवस, सिग्मा (पब्लिकेशन ऑफ नॉर्विलिस) ।
चन्देल अनुज आदि (2007) । इकोनॉमिक इवॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंटल बेनिफिट्स ऑफ वायोफ्यूल एन इंडियन प्रोस्पेक्टिव । इंटरनेशनल जनरल ऑफ ग्लोबल एनर्जी इश्यूज । 28-4: 357-381 ।
किटी युसुफ (2007) । वायोडीजल फॉम माइक्रोएलजी । वायोटेक्नोलोजी एडवांसेज । 25, 294-306 ।
डावर संगीता (1998) । “डवलपमेंट ऑफ अ लॉ-कॉस्ट ऑक्सी-हाइड्रोजन बयोक्वूल सेल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग नॉस्ट्रॉल एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन” । इंटरनेशनल जनरल ऑफ एनर्जी रिसर्च 22, 1019-1028 ।
डेंग-मिंग-डे एंड कोलेमन जॉन आर. (1999) । एथेनॉल सिन्थेसिस वाय जेनेटिक इंजिनियरिंग इन सायनोवैक्टिरिया एफ्लाइड एंड एनवायरनमेंटल माइक्रोवायलोजी । 65, 523-528 ।
दत्ता देवज्योति आदि (2005) । हाइड्रोजन प्रॉडक्शन वाय सायनोवेक्टोरिया । रिव्यू माइक्रोबिअल सेल फेक्टरीज, 4:36 ।
जेन्सन, मार्शल आदि (2003) । एनक्लोज्ड आउटडोर फोटोवायो रिएक्टर्स: लाइट रेजिम, फोटोसिन्थेटिक एफिशिएंसी, स्केल-अप एंड फ्युचर प्रोस्पेक्टस । वायोटेक्नोलोजी एवं वौयोइंजीनियरिंग । 8 ।
जॉना क्लेयर आदि (2008) । फोटोसिन्थेसिस विथ इन पोर्स सिलिका जेल: वायेविलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ एनकेप्लूलेटेड सायनोवैक्टिरिया । जनरल ऑफ मेटिरियल्स केमिस्ट्री । 18, 2833- 2841 ।
कूज ऑफ आदि (2005) । फोटोसिन्थेसिस: ए क्लुप्डिंट फॉर सोलर एनर्जी केचर एंड वायोहाइड्रोजन प्रॉडक्शन टेक्नोलॉजीज । फोटोकेम फोटोवायोल साइन्स, 4, 957-969 ।
कुरेविजा टॉमिस्लाव एवं कुकुल्ज नेनन्द (2004) । एलजीवायो फ्यूल एज ए पॉसिबल अल्टरनेटिव टू एनवायरनमेंटली डाउटफुल कन्वेंशनल मेथडस ऑफ वायोडीजल प्रॉडक्शन ।
लेले सतीश (2006) । वायोडीजल एवं जैट्रोफा कल्टीवेशन । एगोवायोस (भारत) ।
नेडवल लाडिस्लाव आदि (2008) । ए फोटो वायोरिएक्टर सिस्टम फॉर प्रिसिजन कल्टीवेशन ऑफ फोटो ऑटो ट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्मस एंड फॉर हाइ कन्ट एनालेसिस ऑफ सस्पेंशन डायनामिक्स
वायोटेक्नोलॉजी एंड वायोइंजीनियरिंग । 100, 5 ।
पारिखज्योति एंड वालिया अमित (2001) । टेक्नोइकोनॉमिक एसेसमेंट ऑफ वायोएनर्जी इन इंडिया टेक्नोलोजी इन्फोरमेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल (TIFAC) अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी एवार्ड डेड (IRADe) प्राजेक्ट ।
पिंग रोजर एवं खेंशगी हाखन (2005) । द फोटोवायोलोजिकल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन: पोटेन्शियल एफिशिएन्सी एंड इफेक्टिवनेस एज ए रिन्यूएबल फ्यूल । क्वांटिकल न्यूज इन माइक्रोवायलोजी । 31: 19-31 ।
रिट्टमान ई. वूम (2008) । अपोर्चुनिटिस फॉर रिन्यूएबल वायोएनर्जी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म । वायोटेक्नोलोजी एंड वायोइंजीनियरिंग । 100 ।
रागौस्कस आर्थर आदि (2006) । द पाथ फॉरवर्ड फॉर वायोफ्यूल एंड वायोमेटिरियल्स साइन्स । 484: 311 ।
शुख केंथरीन आदि (2004) । सायनो वेक्टिरियल H₂ प्रॉडक्शन-ए कम्पेरेटिव एनालेसिस । प्लांटा । 218: 350-359 ।
सिगाकोव ए. ए. आदि (1999) । H₂ फोटोप्रोडक्शन वाय वेच कल्चर ऑफ एनाबिना वेरिआविलिस ATCC 29413 एंड इटस्पूटेड pk84 इन ए फोटो वायोरिएक्टर । वायोटेक्नोलॉजी एंड वायोइंजीनियरिंग 64:6 ।
टर्नर जॉन आदि (2008) । रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंटरनेशनल जनरल ऑफ एनर्जी रिसर्च । 32: 379-407 ।
वरमास WFS (1998) । जीन मोडिफिकेशन एंड स्यूटेशन मेपिंग टू स्टडी द फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम II । मेथ. एनजामोल । 297: 293-310 ।