


**दंश-रे (स्टिंग-रे) एक अनोखा मत्सजिव
बबन इंगोले, उध्द्व सुर्यवंशी और आर.ए.श्रीपदा
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोन पावला, गोवा.**


विश्व में बहुत समय से उपस्थित्युक्त (Cartilaginous) मत्स प्रजातियाँ हैं। इसमें दंश रे (स्टिंग रे) मानव ने बहुतांश उपाभोग किया है। [चित्र 1] स्टिंग-रे बहुत ही उपायोगी मत्सजीव है, क्योंकि इसके शरीर का हर एक अवयव विविध उत्पादन में उपयोगी होता है। जैसे जबड़ा (Jaw) तथा चर्म (Skin) लकड़ी पॉलीथ के लिए यकृत तैल (Liver oil) में विटामिन-ए (Vitamin-A), उपास्थि तथा मांसल (Cartilage and Flesh) शरीर भोजन के लिए होता है। दंश-रे (स्टिंग-रे) का चमड़ा (Leather) बौग, वस्त्र, बैग, पर्स, जैकेट तथा कमर का पट्टा आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है।



चित्र 1- अ) हिंमालय गिरारडी (शार्पनोज़ स्टिंग-रे) सामान्यतः भारत के पूर्वी तट पर घटनेवाला एक दृश्य ब) स्टिंग रे के शरीर के विभिन्न भागों को दर्शाता रेखाचित्र

[चित्र 2] विश्वस्तरीय वाजारों में स्टिंग-रे के चमड़े उत्पादन की बढ़ती माँग, तथा समुद्रों में प्रखर आनय मत्स्यन के कारण इन प्रजातियों की जनसंख्या दुर्गति से लुप्त हो रही है। अंतर्वर्ग एलास्मोब्रैकिआइ (उपास्थिभिन्) में स्टिंग-रे मत्सजीव प्रमुख लक्ष्य उपायाज्य हो रहा है। क्योंकि इसका विशाल आकार, [चित्र 1] संथगति, आनाय मत्स्यन की सुभेदद्रता तथा समुद्रों में उपरिय क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति होने के कारण समुद्रों में जहाँ अधिक मात्रा में पाने वाला मत्सजीव आज दुर्लभ हो गये हैं एवं स्थानीय तटीय जलक्षेत्रों में विलुप्त हो रहे हैं।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय (MOEF) ने पूरी तरह इस संकटग्रस्त एलास्मोब्रैकिआइ (Elasmobranches) उपास्थिभिन् (Cartilaginous) प्रजातियों के संरक्षण के लिए नियम लागू किये हैं। इसके वाचजुद भी अधिकाधिक मात्रा में इसे पकड़ा जा रहा है। असंतुलित नियंत्रणाभार तथा विश्वस्तरीय वाजारों में स्टिंग-रे की बढ़ती हुई माँग से स्टिंग रे की कुछ प्रजातियाँ संकटग्रस्त हो गये हैं। इसलिए इन प्रजातियों पर नियंत्रित निलय संरक्षण एवं संग्रहण होना आवश्यक है। इस संशोधित पुनः सर्वेक्षण लेख में हम दंश-रे (स्टिंग-रे) की वर्तमान जानकारी का परिक्षण तथा प्रजातियों में संरक्षण मत्स्यन प्रबंध तकनिक के विषय में लेख प्रकृत कर रहे हैं।



चित्र 2- a) महिलाओं के लिए बड़े स्टिंग रे के चमड़े से बना हैंडबैग के सहित बांस की हैंडल जिस पर हाथ से बनी स्टिंग रे पैनेल की अद्वितीय चित्र b) रोजे चिन्हित हैंडबैग c) महिलाओं के लिए स्टिंग रे के चमड़े से बनी पर्स d) स्टिंग रे के चमड़े के पर्स, जेब e) स्टिंग रे बेल्ट f) स्टिंग रे जैकेट्स

परिवार डसाइटीडी (Dasaytidae) इनमें स्टिंग-रे, नदी तट स्टिंग-रे, जिसकी 9 जाति एवं 70 प्रजातियां जिनकी दो सबकुल होते हैं। डसायतिना (Dasayatinae) में 6 जाति (genus) एवं 50 प्रजातियां शामिल हैं और पोटामोट्रोगोनिया (Potamotrygoninae) जिसमें 3 जाति (genus) और 20 प्रजातियां होती हैं। भारत में नदीयाँ, समुद्रों में 20 से अधिक प्रजातियां पायी जाती हैं। विश्व में स्टिंग-रे प्रजातियों की उपलब्धता उष्ण तथा शीतल जल क्षेत्रों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, आफ्रिका, अमेरीका में पायी जाती है। भारत में मिलने वाली प्रजातियां निम्नलिखित तख्ते पर दिखाई गयी है।

तख्ता नं भारत में मिलने वाली स्टिंग-रे प्रजातियां

वैज्ञानिक नाम	साधारण नाम
हिमातुग लिक्की	काइट टेन स्टिंग-रे
हिमातुग उअरनाक	कार्न कोव स्टिंग-रे
हिमातुग गेगारडी	आयनेज स्टिंग-रे
डसाइटीज मॉचकोवम	अंनानडेलम स्टिंग-रे
डसाइटीज पास्टीनाक	बू स्टिंग-रे
डसाइटीज वॉलगा	स्क्रेनी स्टिंग-रे
पास्टीनाक सिफेन	डूव स्टिंग-रे
टैनीउरा लिम्बा	रिवन टेल-रे
टैनीउरा भित्थिनोस्थीना	फिन टेल-रे
गोयेवेज नजिनग	सॉटड इगल-रे
गोटेभाकलेअस निकोफेरी	निअफम इगल-रे
भायलेओवेटरम मख्युलेटम	मॉलेड इगल-रे
रिनोपेटा अंडायवर्स	एफ क्व-रे

सिनोपेट्या जवानिक्र	जवानिज कऊरे
मंटा विरोस्ट्रीज	डेवील-रे
मोबुल्ल मोबुल्ल	हॉर्नी-रे
नार्सिन टिम्ले	इलेट्रिक-रे
जिमुआ टैट्याक्यूयाट	टैव्याकल वटर फेलय
ऑपोस्ट्रीअस इंग्रीविल्स	चैनीडो खेल्ती स्टिंग-रे
हिमातुरा जेनकिन्सी	शॉर्प नोज स्टिंग-रे

स्टिंग-रे उथली जलो में तथा रेतीले तली के नीचे एवं समुद्र में अन्तरज्वारिय क्षेत्रों से लेकर तकरीबन 10-15 मीटर से अधिक गहाराई में पाया जाता है। सामान्यतः स्टिंग-रे समुद्र में उथले जल तथा अन्यान्य कठोर सतहों में रेत के नीचे पाया जाता है। स्टिंग-रे का विशाल आकार 20 से.मी. से 2 मीटर एवं अधिक होता है। इसकी अंस पंख (Pectoral Fin) तैरने में मदद करता है जिससे की यह उड़ता हुआ नजर आता है। स्टिंग-रे की वडी अंस पंख कुछ प्रजातियों में वृत्ताकार (Circular), अंडाकार (Oval), चतुष्कोनी विंव (Rhomboidal disc) की तरह होती है और इसी पंख पर अगले हिस्से में उसका पोथ (Snout) तथा सिर जुड़ा रहता है। इसका अंस पंख (Pectoral Fin) के अलावा 1-3 गुना उसकी विशाल पुंछ होती है [चित्र 1]। इसकी आँखें सिर के ऊपर होती हैं। स्टिंग-रे में अधर गील (Ventral gill) की प्रणाली होती है जिसमें की मिट्टी एवं रेत में छुपे होने पर भी यह अपनी श्वासरंध्र (Spracle) से जल को नियंत्रित करता है। स्टिंग-रे में लघु तथा मध्यम आकार का दौंत का समावेश एक पंक्तियों में होता है। कुछ प्रजातियों में 60 पंक्तियों से अधिक दौंत की व्यवस्था पांच समूह में पायी जाती है। स्टिंग-रे के पुंछ के ऊपरी भाग में एक या दो जहरीला कांटा होता है जिसमें विष होता है। आमतौर पर समुद्र में कई मछुवारों को इसके कांटे की चुभन हुई है। हाथ या पांव गलती से रखने पर या जरा सी चुक होने पर झटके से यह काँटा चुभा देता है। इस काँटे की चुभन इतनी पीड़ादायक होती है कि कभी कभी ज्वर तथा जान भी जा सकती है। इसका विष सर्वप्रथम हृदय एवं खुन के रक्त संचालन को प्रभावित करता है जिससे की हृदय की मांसपेशियों की गतिशिलता क्षीण हो जाती है। अन्ततः श्वास प्रक्रिया बाधित होने लगती है। असहनीय जलन और पीडा से प्राणी छटपटाने लगता है।

भोजन - स्टिंग रे मुख्य रूप से छोटी छोटी मध्यम आकार की मछलिया, झिंगा, सोपी (Mussle), कंकड़ा आदि का सेवन करते हैं। कुछ प्रजातियां स्कैड, तथा जैलफिस् आदि को यह भोजन के रूप में पंसद करते हैं।

उपयोग- स्टिंग रे का शिकार समुद्र में आधुनिक [चित्र 3] उपकरणों से किया जाता है। उपास्थियुवत माल्स्की का उपयोग मानव भोजन के रूप में पुरातन युगों से करता आ रहा है। जैसे की सौ साल से अधिक समय से ऑस्ट्रेलियन अवोराजिनिस (Australian Aborigines) स्टिंग-रे का उपयोग भोजन में चलता आ रहा है। सामान्यतः स्टिंग-रे का हर एक भाग उपयोग में लाया जाता है।

कुछ देशों में काऊटेल स्टिंग-रे प्रजातियां भोजन में और इसके परिक्षण के बाद "कामावोको" (Kamaboko a semi cylindrical Japanese cuisine) खाद्य उत्पादन में किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके निल्कर्षण से बहुत से उपयोगी संशोधन परिक्षण किये गये हैं। अतः वैज्ञानिकों ने इसे 'विनोम' (Venom) स्टिंग नाम दिया है। तान्त्रिआविपी (Neurotoxic), हृदयआविपी (Cardiotoxic), घातक अनुकिया (Lethal activities) जैसे अविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण किये गये हैं। कुछ प्रजातियों के पंख का उपयोग सूप एवं एपोडायसिक (Aphorodisiac) में किया जाता है।

कुछ स्टिंग-रे का उपयोग दवाई में किया जाता है। कॉन्ड्रोइटिन (Chondroitin) जिसमें प्रोटीन का उपयोग त्वचा प्रतिस्थापन (Skin replacement) हेतु किया जाता है। कुछ प्रजातियों को ग्लास अँक्वेरियम में रखा जाता है।

स्टिंग-रे के कुछ अवयव निकर्षण द्वारा मांस का उपयोग ट्युबर तथा कैंसर जैसी विमारी में किया जाता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि स्टिंग-रे एक बहु उपयोगी मछली होने के कारण कहीं इसका हनन (Over exploitation) न हो जाए एवं इनके अन्न तथा औषधि उपयोग गुण को देखते हुए इसे संरक्षण देना बहुत ही सगहनीय है।

डायटिंग स्टिंग-रे का व्यापार उपयोग महत्व

दो विदेश में इन प्रजातियों की बढ़ती हुई मांग तथा उत्पादन से मिलता हुआ लाभ और असंतुलित मत्स्य उद्योग से उपयोगी मुनाफा। भारत में एलास्मोबेकिआइ (Elasmobranch) मछलियों का निर्यात व व्यापार हर साल में करीब 70,000 टन से अधिक होता है और राज्य के सभी स्थानीय बंदरगाहों पर इसका सर्वेक्षण भी किया जाता है पर कभी कभी बड़ी नौका, ट्रॉल पर आक्रामिक मिलनवाली यह प्रजातियां के अवयव काटकर वचा हुआ भाग पानी में फेंका जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी या रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस वजह से कुछ प्रजातियां दुर्लभ हो जाती हैं।



चित्र 3 a) मछुआरे मछली पकड़ने वाली उनकी नाव के साथ एवं स्टिंग रे मछली दर्शाता मछवारा
b) भारत के पूर्वी तट पर स्टिंग रे पकड़ते हुए मछवारे

2004 (IUCN) के विश्व सर्वेक्षण के अनुसार मछलीयों के 800 प्रजातियों को संकटाग्रस्त घोषित किया गया है। इन मछलीयों में शार्क, स्टिंग-रे, स्केट्स कि संख्या 1996 में 734 से लेकर अब 2004 में 800 हो गयी है। इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण विभाग (Ministry of Environment Forest) ने एलास्मोबेकिआइ उपास्थिमिन (Elasmobranch) प्रजातियों पर मात्सन करने पर प्रतिबंध किया किया है। इसके वावजुद भी आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में अनियंत्रित मात्सन तथा मछली धिंकार किया जाता है तथा स्टिंग रे को लक्ष्य बनाकर धिंकार किया जाता है। शार्क का धिंकार अपवाही जाल (Drifts nets), हुक (hooks), लाईन (lines) तथा स्टिंग-रे स्केट्स, गील नेट्स, आनाय मत्सन (Trawl nets) द्वारा 5 से 150 मीटर तक गहराईवाले पानी में किया जाता है।

निष्कर्ष/अनुमान :

विश्व के सभी विशाल समुद्रों में स्टिंग रे कि प्रजातियां धीरे धीरे सीमित हो रही हैं। अतः इसके संरक्षण, संवर्धन तथा तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार को इन प्रजातियों पर आवश्यक कदम उठाना चाहिए तथा समुद्र में होने वाली निर्दय मत्स्य को रोकना चाहिए। इस विषय पर तटीय मछुआरों को विशेष रूप से जागरूक बनाने की आवश्यकता है जिससे की वे स्टिंग-रे के प्राप्ती स्थलों का अतिदोहन न करें। तथा ऐसे स्थलों को प्रदुपण मुक्त करना चाहिए अन्यथा यह प्रजातियां दुर्लभ तथा लुप्त हो जायेंगी।